



Classes de risques des pollens allergéniques

Pour l'appréciation des concentrations polliniques, il est important de connaître les limites des classes de risque des taxon analysés. En effet, comme les pollens de ces taxons diffèrent par leur potentiel allergène, les limites des classes de risque sont elles aussi différentes.

La répartition en classes de risques est valable pour la concentration journalière moyenne de pollen.

Espèce	faible	moyenne	fort	très fort
Noisetier (Corylus)	1 - 10	11 - 69	70 - 249	≥ 250
Aune (Alnus)	1 - 10	11 - 69	70 - 249	≥ 250
Frêne (Fraxinus)	1 - 10	11 - 99	100 - 349	≥ 350
Bouleau (Betula)	1 - 10	11 - 69	70 - 299	≥ 300
Charme (Carpinus)	1 - 10	11 - 69	70 - 249	≥ 250
Platane (Platanus)	1 - 49	50 - 99	100 - 399	≥ 400
Chêne (Quercus)	1 - 49	50 - 129	130 - 399	≥ 400
Hêtre (Fagus)	1 - 49	50 - 129	130 - 399	≥ 400
Chataignier (Castanea)	1 - 99	100 - 199	200 - 699	≥ 700
Graminées (Poaceae)	1 - 19	20 - 49	50 - 149	≥ 150
Oseille (Rumex)	1 - 14	15 - 24	25 - 59	≥ 60
Plantain (Plantago)	1 - 14	15 - 24	25 - 59	≥ 60
Armoise (Artemisia)	1 - 5	6 - 14	15 - 49	≥ 50
Ambroisie (Ambrosia)	1 - 5	6 - 10	11 - 39	≥ 40

Concentrations polliniques journalières moyennes [pollen/m³]